



## Vademecum CONIGLI

# Hai un coniglio? Ecco quello che devi sapere...

### Sistemazione

Il coniglio non può vivere in gabbia come vuole farvi credere la maggior parte dei negozianti, come stareste voi a vivere sempre rinchiusi in gabbia? il coniglio ha bisogno di muoversi liberamente, in caso contrario andrebbe incontro allo sviluppo di gravi patologie fisiche (zampe, problemi ossei, obesità, blocchi intestinali) e mentali che porterebbe l'animale a sofferenza e morte! Ecco le soluzioni:

**GIARDINO CON RECINTO** la recinzione deve essere molto fonda perchè il coniglio scava, riparato da predatori o altri animali, da sole, pioggia e senza piante velenose.

**TERRAZZO** riparato da sole, pioggia e senza piante velenose, se avete la ringhiera mettete una rete abbastanza alta perchè il coniglio rischia di cadere.

**CASA** proteggete la stanza dove il coniglio sarà libero di girare, coprite i fili elettrici con della rete o bioadesivo e spostate tutto ciò che il coniglio potrebbe rosicchiare (tende, tappeti, libri ecc.)

Non tutti i conigli rosicchiano, dipende dal carattere, mettetgli a disposizione dei scatoloni di cartone su cui sfogarsi.

Mettete la lettiera dove poi lui imparerà a fare pipì come i gatti. Come lettiera usate il pellet di legno per stufe, assorbe bene ed è economico.

Tenete pulite le lettiere per evitare infezioni alle zampe.

### Alimentazione

La dieta ideale del coniglio deve essere esclusivamente a base di:

**FIENO** tutti i giorni abbondante, non deve mai mancare perchè aiuta il sistema gastrointestinale a funzionare bene e aiuta anche il consumo dei molari, che invece non vengono usurati dal consumo di pellets.

**ERBA** che non sia trattata con pesticidi.

**VERDURA MISTA** tutti i giorni divisa in 2 pasti più o meno 150 gr per kg di peso di coniglio, la verdura deve essere lavata e mai da frigo.

basilico, broccoli, carote, catalogna, cavolo, cicoria, finocchio, indivia, insalate varie, pomodori (non le foglie ed i semi, sono tossici), peperoni, radicchio, sedano, scarola, spinaci, zucchine, verza.

Verdure ricche di calcio sono consigliate non più di 3 volte la settimana se il coniglio ha problemi di calcoli:

alfalfa (erba medica), catalogna, cavoli, cicoria, cime di carota, prezzemolo, rape, spinaci, tarassaco, trifoglio.

**FRUTTA** 2 volte la settimana non di più perchè ingrassa:

ananas, anguria, banana, ciliegie (senza nocciolo), fragole, mela (senza semi), melone, mirtillo, pera, pesca, kiwi, uva (senza semi).

**ACQUA** pulita e sempre a disposizione, è preferibile usare l'abbeveratoio a goccia controllando che funzioni bene e che il coniglio riesca a bere.

Il pellet non è indispensabile, ma se si vuole darlo non più di 20-30 gr al giorno e solo di buona qualità (a base di erbe con fibra al 18%)

Non dare i mangimi con semini, granaglie, cose colorate, cereali o coccidiostatico perchè fanno male al fegato, reni, apparato digerente e negli anni rovinano i denti del coniglio.

**Piante tossiche da evitare assolutamente**

Selvatiche:

Anemone, Belladonna, Calla, Cicuta, Convolvolo, Croco, Digitale, Linaria, Quercia, Tasso, Ligustro, Tremolo, Morella, Mughetto, Papavero, Patata, Sambuco, Vitalba.

Da appartamento:

Dieffenbachia, Felci, Oleandro, Primula, Rododendro, Stella di natale.

ce ne sono molte altre, le trovate su [www.casafreccia.it](http://www.casafreccia.it)

**Altri cibi da evitare perchè fanno molto male al coniglio:**

cioccolato, legumi (fagioli, piselli ecc.) patate, aglio, cipolla, mais, semi, granaglie, pasta, pane, merendine e dolci, noci, mandorle e leccornie per conigli in vendita nei negozi.

## Sterilizzazione

**Maturita' sessuale:**

Indicativamente il coniglio raggiunge la maturita' sessuale intorno ai 3-4 mesi, anche prima nei nani (2-3 mesi) e piu' tardi nelle razze grandi (4-6 mesi).

Al raggiungimento dell'eta' adulta il nostro coniglio, stimolato dagli ormoni, comincera' a cercare un compagno o una compagna per accoppiarsi. Nel caso di una coppia di conigli, cioè maschio e femmina, presto, forse prima di quanto potremmo immaginare, la femmina potrebbe essere fecondata e dopo 30 giorni dall'accoppiamento nascerebbero i cuccioli.

Il coniglio **maschio**, al raggiungimento della maturita' sessuale ha un esplosione di ormoni che lo fara' cambiare in poco tempo...da tenero batuffolo a una vera macchina del sesso! Comincera' a spruzzare pipi' dovunque, spargere caccoline fuori dalla lettiera, a volte anche ringhiare e diventare aggressivo verso di noi, tutto questo per segnare il territorio. L'appetito sessuale gli fara' montare tutto cio' che trova (oggetti, pelouche, altri animali e le nostre gambe!) causandogli irritazioni ai genitali e forte stress fisico-psicologico dovuto al non potersi accoppiare come sarebbe nella sua natura.

Stessa cosa per la **femmina** la maggior parte diventano molto aggressive e territoriali e manifestano lo stesso comportamento e frustrazione dei maschi, inoltre dopo i 2 anni hanno alto il rischio di avere tumori all'utero ed ovaie.

Il comportamento puo' essere piu' o meno accentuato nei vari soggetti, ma tutti comunque subiscono un forte stress.

Nel caso di una coppia saremmo costretti a tenerli divisi per evitare continue gravidanze e questo aumenta lo stress del coniglio.

Far accoppiare il coniglio ogni tanto non migliora le cose, anzi le peggiora!

Anche nel caso di 2 conigli dello stesso sesso se non sterilizzati la convivenza pacifica è impossibile, ci sarebbero lotte continue con gravi conseguenze!

La sterilizzazione risolve tutti questi problemi perchè non avrebbero piu' ormoni in circolo, il coniglio (sia maschio che femmina) ritorna ad essere tranquillo a non sporcare piu' in giro ed a vivere tranquillamente con un altro coniglio o altro animale.

Se si decide per la sterilizzazione rivolgetevi solo ed esclusivamente ad un veterinario ESPERTO in conigli.

### Vaccinazioni:

A 60 giorni di vita del coniglio si possono eseguire le vaccinazioni fondamentali, da ripetere per tutta la vita.

Le vaccinazioni da fare sono:

per la **MIXOMATOSI** e per la **MALATTIA EMORRAGICA VIRALE (MEV)**.

Queste malattie si trasmettono per via diretta fra conigli, oppure per via indiretta tramite insetti (zanzare, pulci ecc.) o da oggetti contaminati.

E' molto importante farle, perchè sono malattie mortali e non esistono cure.

### Sintomi di malessere:

Segni di malessere che richiedono l'intervento immediato del veterinario:

il coniglio non mangia, non scarica, sta fermo in un angolo, è apatico, ha segni di dolore puo' essere segno di un blocco intestinale, causa molto frequente, se riconosciuta in tempo e curata entro le 12 ore il coniglio si puo' salvare, non aspettate correte dal veterinario per una terapia adeguata.

Lacrimazione, starnuti continui, testa inclinata, diarrea, perdita di sangue, zoppica, scolo nasale, respiro affaticato, fatica ad urinare, digrignamento dei denti. Subito dal veterinario!

Importante per il coniglio è la **terapia antidolorifica**, se il coniglio ha dolore smette di mangiare aggravando il blocco intestinale.

Come antidolorifico potete usare il METACAM gocce (lo trovate in farmacia) di regola vanno date 2 gocce per kg di peso, in ogni caso consultate il vostro veterinario di fiducia.

Il coniglio ha ossa molto fragili, una presa sbagliata o una caduta possono portare gravi conseguenze, prima fra tutte la lesione della spina dorsale.

**Non date i conigli in mano ai bambini!**

**PER OGNI PROBLEMA CONSULTATE UN VETERINARIO ESPERTO IN CONIGLI!**

A cura di Cinzia Sona

per maggiori informazioni consultate il sito [www.lavocedeiConigli.it](http://www.lavocedeiConigli.it)

  
**www.LavocedeiConigli.it**