Hai trovato un coniglietto orfano?

Scheda rapida di primo soccorso — La Voce dei Conigli

È una fase molto delicata: facciamo tutto il possibile, ma non sempre ce la fa. Se ha almeno 3–7 giorni di vita ha potuto colonizzare un minimo l'intestino con il primo latte materno: le possibilità ci sono, ma si tira un sospiro di sollievo solo verso il mese di età, dopo un esame feci negativo per coccidi.

1. Il nido

- Scatola con bordi alti, fieno e copertine di lana (o pile "peloso")
- Temperatura interna 28–30°C; borsa dell'acqua calda su un lato, così si sposta da solo dove sta meglio
- Quando apre gli occhi (~10 giorni): passare a un trasportino con zona riscaldata, per evitare cadute mentre esplora

2. Il latte: cosa usare

Prima scelta: Beaphar latte per conigli e piccoli roditori.

In attesa che arrivi (notte, festivo, non ancora in casa): latte per gattini, oppure latte di capra intero.

- Latte per gattini: il doppio della concentrazione standard — **1 misurino ogni 10 ml d'acqua** (non 20 ml come per i gattini)
- Latte di capra intero: diluire a metà con acqua (meno digeribile, ma utilizzabile in emergenza)
- Temperatura del latte: ~28°C — verificare con una goccia sul polso, né calda né fredda

■ **MAI latte vaccino, né sostituti per vitelli, puledri o suinetti (anche se in etichetta "per più specie"): contengono troppo lattosio e possono causare diarrea fatale nel coniglio.**

3. Come somministrare la poppata

- Siringa senza ago, coniglietto in posizione orizzontale (mai a pancia in su)
- Poco alla volta, lentamente: quando smette di succhiare non insistere, ha mangiato a sufficienza
- Meglio 2–3 poppate piccole al giorno che 1 grande: riduce il rischio di aspirazione
- Se il latte va di traverso: pancia in giù sulla mano, colpetti delicati sulla schiena
- Non serve stimolare pipì/cacca come nei gattini: nel coniglio il riflesso è già autonomo

4. Dosaggi indicativi (variano con razza, età, latte usato)

Età / peso	Quantità/poppata (totale/die)	Pasti al giorno
Primi giorni (fino a ~65 g)	2–6 ml (8–13 ml/die)	3–5
1–2 settimane (~65–120 g), occhi aperti ~10 giorni	4,5–10 ml (13–20 ml/die)	2–3
Dopo le 2–3 settimane (oltre 120 g)	fino a 10 ml (fino a 20 ml/die)	max 2, poi a scalare

5. Cibo solido e svezzamento

- Da quando apre gli occhi: fieno sempre a disposizione; dalle 2–3 settimane anche erba medica
- Pellet junior friabile (es. Burgess Junior) a disposizione illimitata insieme al fieno: il coniglio in crescita ne ha bisogno, il razionamento arriva solo verso i 6–7 mesi
- Quando mangia bene solido e beve da solo: ridurre gradualmente il latte (quantità, poi frequenza) fino a toglierlo — la crescita in genere non rallenta, anzi accelera

6. Quando chiamare SUBITO il veterinario esperto in esotici

Pelle che resta "a tenda" se pizzicata, letargia, pancia gonfia, diarrea, non prende peso per 2 giorni di fila, non mangia/beve più. Pesare il coniglietto ogni giorno, alla stessa ora: è l'indicatore più affidabile che tutto proceda bene.

Questa è una scheda indicativa di primo soccorso: non sostituisce il parere di un veterinario esperto in animali esotici. Per dubbi o per l'affido, contatta La Voce dei Conigli — www.lavocedeiconigli.it